

**RISQUE DE PALUDISME SELON LES REGIONS
DANS LES PAYS OU LE PALUDISME EST ENDEMIQUE (novembre 2011)**

CQ : chloroquine – PG : proguanil – AV : atovaquone - MQ : méfloquine - D : doxycycline

NB : On considère qu'il n'y a pas de paludisme dans les pays qui n'apparaissent pas sur cette liste.

Pays	Régions présentant des risques pour le paludisme dans ce pays (d'après le CDC)	Recommandations françaises (selon le BEH)	Vaccination antiamarile
Afghanistan	Régions situées à moins de 2 000 m d'altitude entre avril et décembre	MQ ou D ou AV/PG facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Afrique du Sud	Régions à basse altitude de la province de Mpumalanga (y compris le Parc national Kruger), la province du Nord (Limpopo) et le nord-est du KwaZoulou-Natal jusqu'au fleuve Tugelan au sud	MQ ou D ou AV/PG pour le NE Ailleurs, pas de prophylaxie	Non
Algérie	Petit foyer d'infection à Ihrir	Pas de prophylaxie	Non
Angola	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Arabie Saoudite	Toutes les régions de la province occidentale, en dessous de 2000m. Aucun risque dans les villes de Jeddah, la Mecque, Médine et Taif	MQ ou D ou AV/PG au sud et à l'ouest. Ailleurs, pas de prophylaxie facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Argentine	Régions rurales des provinces de Salta et de JuJuy (à la frontière de la Bolivie) et des provinces de Misiones et de Corrientes (à la frontière du Paraguay)	CQ pour le N (srtd <i>P. vivax</i>) Ailleurs, pas de prophylaxie facultatif si <7j pour tt le pays	Recommandé en zones forestières du N et NE (et chutes d'Iguassu + Misiones)
Arménie	Risque limité aux régions situées près des frontières des pays occidentaux : Masis surtout, Vallée d'Ararat dans les districts d'Ararat et Artashat. Aucun risque dans les régions touristiques	Pas de prophylaxie	Non
Azerbaïdjan	Basses terres rurales, entre juillet et octobre; risque le plus élevé dans les régions situées entre les fleuves Kura et Arax	Pas de prophylaxie	Non
Bahamas	<i>P. falciparum</i> à Great Exumas. Pas de transmission sur les autres îles	Pas de prophylaxie	Non
Bangladesh	Toutes, sauf la ville de Dhaka	MQ ou D ou AV/PG A Dhaka, pas de prophylaxie	Non
Belize	Régions rurales, y compris les centres de villégiature, les îles côtières et les réserves forestières, mais aucun risque dans la ville de Belize	CQ (srtd <i>P. vivax</i>) facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Bénin	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Bhoutan	Régions situées au sud de cinq districts en dessous de 1700m : Chirang, Samchi, Samdrupjongkhar, Sarpang et Shemgang	MQ ou D ou AV/PG facultatif si <7j pour tt le pays	non
Birmanie	voir Myanmar		Non
Bolivie	Régions rurales situées < 2 500 m d'altitude; départements de Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Santa Cruz et Tarija. Pas de risque dans la ville de La Paz.	MQ ou D ou AV/PG pour l'Amazonie Ailleurs, CQ, (srtd <i>P. vivax</i>) facultatif si <7j sauf Amazonie	Obligatoire (risque limité à La Paz et à Sucre). Une décharge peut être signée sur place.
Botswana	Partie septentrionale du pays (au nord du 22°S), y compris les safaris dans le delta de l'Okavango. Pas de risque à Gaborone.	MQ ou D ou AV/PG	Non

**RISQUE DE PALUDISME SELON LES REGIONS
DANS LES PAYS OU LE PALUDISME EST ENDEMIQUE (novembre 2011)**

CQ : chloroquine – PG : proguanil – AV : atovaquone - MQ : méfloquine - D : doxycycline

NB : On considère qu'il n'y a pas de paludisme dans les pays qui n'apparaissent pas sur cette liste.

Pays	Régions présentant des risques pour le paludisme dans ce pays (d'après le CDC)	Recommandations françaises (selon le BEH)	Vaccination antiamarile
Brésil	États d'Acre, de Rondonia, d'Amapa, d'Amazonas, de Roraima et Tocantins. Parties des Etats de Maranhao (O), Mato Grosso (N), Para (sauf la ville de Belem). Il y a également risque de transmission dans des régions urbaines, notamment dans la périphérie de grandes villes comme Porto Velho, Boa Vista, Macapa, Manaus, Santarem et Maraba	MQ ou D ou AV/PG pour l'Amazonie Ailleurs, pas de prophylaxie	Oui, dans les Etats de Acre, Amapá, Amazonas, District Fédéral (y compris Brasilia), Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima and Tocantins, et certaines régions des Etats de Bahia (NO et O), Parana (Centre et O), Piauí (SO), Rio Grande do Sul (NO et CentreO), Santa Catarina (extrême O) et São Paulo (N et O), et les chutes d'Iguassu. Pas de vaccin FJ pour les villes (Rio de Janeiro, Sao Paulo, Salvador, Recife et Fortaleza)
Burkina-Faso	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Burundi	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Cambodge	Toutes, à l'exception de Phnom Penh et autour du lac Tonle Sap. Il existe un risque de paludisme à Angkor Wat.	MQ ou D ou AV/PG (doxycycline ou AV/PG le long des frontières occidentales)	Non
Cameroun	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Cap-Vert	Risque limité dans l'île de Sao Tiago (zone 3 du CDC)	Pas de prophylaxie	Non
Chine	Régions rurales seulement des provinces et régions autonomes d'Anhui, Fuijan, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shandong, Sichuan, Tibet (dans la vallée du Zangbo), Xizang, Yunnan et Zhejiang. Dans les provinces impaludées, la transmission ne survient que par temps chaud. La transmission survient à des altitudes inférieures à 1500 m, de juillet à novembre au nord du 33°N, de mai à décembre entre le 33° N et le 25°N, toute l'année en dessous du 25°N. Remarque : Les voyageurs qui visitent des villes ou qui suivent les itinéraires touristiques ruraux populaires, y compris les croisières sur le Yang-Tsé, ne courent généralement pas de risque et n'ont pas besoin de prophylaxie.	MQ ou D ou AV/PG pour les provinces de Hainan, de Yunnan CQ pour le NE (srtt <i>P. vivax</i>) facultatif si < 7j pour tt le pays, sauf Hainan et Yunnan	Non

**RISQUE DE PALUDISME SELON LES REGIONS
DANS LES PAYS OU LE PALUDISME EST ENDEMIQUE (novembre 2011)**

CQ : chloroquine – PG : proguanil – AV : atovaquone - MQ : méfloquine - D : doxycycline

NB : On considère qu'il n'y a pas de paludisme dans les pays qui n'apparaissent pas sur cette liste.

Pays	Régions présentant des risques pour le paludisme dans ce pays (d'après le CDC)	Recommandations françaises (selon le BEH)	Vaccination antiamarile
Colombie	De façon générale, seulement les régions rurales à moins de 1800 m d'altitude. Aucun risque à Bogota et alentours	MQ ou D ou AV/PG pour l'Amazonie Ailleurs, CQ/PG ou AV/PG	Oui (sauf >2300m, Bogotá, Uribia (Guajira), et non recommandé à l'ouest des Andes <2300m, départements de Cauca, Nariño, Vallée de Cauca, central et sud Choco, et les villes de Barranquilla, Cali, Cartagena, et Medellín)
Comores	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Non
Congo	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Corée (Sud) Rép. de	Risque limité à la zone démilitarisée et aux régions rurales du nord des provinces de Kyonggi et de Kangwon, le long de la zone démilitarisée (zone 1).	Pas de prophylaxie	Non
Corée (Nord) Rép. Pop. démocratique	Risque limité dans certaines régions du sud (zone 1). Aucun risque à Pyongyang	Pas de prophylaxie	Non
Costa Rica	Provinces de Limon (canton de Matina). Aucun risque dans la ville de Puerto Limon	CQ (<i>P. vivax</i>) facultatif si <7j pour tt le pays	Non (mais demandé si arrivée de zone endémique d'Am latine)
Côte d'Ivoire	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Djibouti	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Non
Égypte	Risque limité dans la région de Fayoum et une partie de la région méridionale (Haute-Égypte). Aucun risque dans les principales régions touristiques, y compris lors des croisières sur le Nil	Pas de prophylaxie	Non
El Salvador	Régions rurales seulement des départements de Santa Ana, Ahuachapan et La Union. Pas de risque à San Salvador.	CQ (srtt <i>P. vivax</i>), facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Équateur	Toutes les régions situées à moins de 1 500 m d'altitude (aucun risque à Guayaquil, à Quito et dans les environs, les régions touristiques des hauts plateaux du centre et les îles Galapagos)	CQ à l'Ouest MQ ou D ou AV/PG en Amazonie	Oui, à l'est des Andes (pas de risque à Quito, Guayaquil, ni Galapagos)
Erythrée	Toutes, sauf à Asmara et aux altitudes de plus de 2 200 m	MQ ou D ou AV/PG	Non
Éthiopie	Toutes, sauf à Addis-Abeba et aux altitudes de plus de 2 000 m	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Gabon	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Gambie	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Géorgie	Sud-est du pays près de la frontière de l'Azerbaïdjan et la rivière Kura, et dans les districts de Sighnaghis, Gardabanis et Marneulis, dans les régions de Kakheti et de Kveno Kartli (zone 1). Aucun risque à Tbilissi	Pas de prophylaxie	Non

**RISQUE DE PALUDISME SELON LES REGIONS
DANS LES PAYS OU LE PALUDISME EST ENDEMIQUE (novembre 2011)**

CQ : chloroquine – PG : proguanil – AV : atovaquone - MQ : méfloquine - D : doxycycline

NB : On considère qu'il n'y a pas de paludisme dans les pays qui n'apparaissent pas sur cette liste.

Pays	Régions présentant des risques pour le paludisme dans ce pays (d'après le CDC)	Recommandations françaises (selon le BEH)	Vaccination antiamarile
Ghana	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Guatemala	Régions rurales seulement, en dessous de 1 500 m d'altitude. Aucun risque à Guatemala city, Antigua ou au lac Atitlan	CQ (srtt <i>P. vivax</i>), facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Guinée	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Guinée équatoriale	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Guinée-Bissau	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Guyana	Risque élevé dans toutes les régions rurales de l'intérieur en dessous de 900m. Des cas isolés ont été signalés dans la région côtière	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Guyane française	Toutes, sauf l'île du Diable et les autres îles de la côte	MQ ou D ou AV/PG sur les fleuves Pas de prophylaxie sur les zones côtières	Oui
Haïti	Toutes (Highest rates are registered during May to November. Malaria is endemic to 75% of the land area, with most cases in coastal areas, particularly in rice-growing areas 35 and Artibonite. - 80% of the population live in endemic areas. - There is no risk in the port of Labadee (ie, tourist ship area)	CQ	Non
Honduras	Régions rurales seulement en dessous de 1000m , y compris l'île de Roatan et d'autres îles de la Baie. Risque aux environs de Tegucigalpa et San Pedro Sula	CQ (srtt <i>P. vivax</i>), facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Hong-Kong (R.A.S. de Chine)	Aucun risque	Pas de prophylaxie	Non
Inde	Toutes les régions, y compris Mumbai (Bombay) et Dehli, sauf au dessus de 2 000 m d'altitude dans les États de Himachal Pradesh, Jammu, Kasmir et Sikkim (région montagnarde du nord de l'Inde). Rq/ Les états de Orissa, Madhya Pradesh, Gujerat, Assam, Karanataka, sont les plus à risque de <i>P. falciparum</i> .	Etat d'Assam : MQ ou D ou AV/PG Ailleurs, CQ/PG ou AV/PG	Non
Indonésie	Régions rurales de Sumatra, Sulawesi, Kalimantan et Nusa Tenggara Barat. Pas de risque urbain. Toutes les régions Est (Papua Indonésie, Irian Jaya Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku et Maluku Utara) Aucun risque à Jakarta, les zones touristiques de Bali et à Java (sauf dans les monts Menoreh à Central Java)	Bali : Pas de prophylaxie Ailleurs : MQ ou D ou AV/PG NB : <i>P. vivax</i> résistant à la chloroquine à Irian Jaya	non

**RISQUE DE PALUDISME SELON LES REGIONS
DANS LES PAYS OU LE PALUDISME EST ENDEMIQUE (novembre 2011)**

CQ : chloroquine – PG : proguanil – AV : atovaquone - MQ : méfloquine - D : doxycycline

NB : On considère qu'il n'y a pas de paludisme dans les pays qui n'apparaissent pas sur cette liste.

Pays	Régions présentant des risques pour le paludisme dans ce pays (d'après le CDC)	Recommandations françaises (selon le BEH)	Vaccination antiamarile
Irak	Toutes les régions du nord du pays (Duhok, Erbil, Ninawa, Sulaimaniya et Ta'mim) en dessous de 1500m et dans la province de Basrah. Aucun risque à Baghdad, Tikrit et Ramadi.	CQ (srtd <i>P. vivax</i>), facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Iran (Rép. Islamique d')	Régions rurales des provinces de Sistan-Baluchestan, et partie méridionale de Kerman et d'Hormozgan. Régions d'Ardebil et Azerbijan Est, au nord des montagnes Zagros entre mars et novembre.	MQ ou D ou AV/PG pour le SE Ailleurs, CQ (srtd <i>P. vivax</i>) facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Jamaïque	Risque très limité à Kingston, ne justifiant pas de prophylaxie	CQ : Kingston seulement	
Kenya	Toutes les régions, y compris les parcs animaliers; Pas de risque dans la ville de Nairobi et au dessus de 2 500 m	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Kyrgystan	Risque au sud et à l'ouest du pays (surtout Batken, Osh et Jalal-Abad à la frontière du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan). Risque à Bishkek.		Non
Laos (Rép. Pop. démocratique)	Toutes les régions, sauf la ville de Vientiane	MQ ou D ou AV/PG	Non
Libéria	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Madagascar	Toutes -Zone côtière Est et Nord : transmission pérenne hyperendémique -Zone occidentale : transmission saisonnière (Octobre à Mai), -Zone de plateaux d'altitude : transmission faible ; paludisme en mode épidémique, avec saisonnalité très marquée (Novembre à Avril). -Zone aride au Sud : transmission irrégulière, conditionnée par la pluviométrie, le paludisme y est parfois épidémique	CQ/PG ou AV/PG	Non
Malaisie	Régions rurales seulement (surtout les régions forestières, reculées et montagneuses au centre du pays). Aucun risque dans les régions urbaines ou côtières, ni dans la République de Singapour. Rq/ Paludisme à Taman Negara National Park (péninsule), Sabah et Sarawak (risque minime sur la côte et dans les villes) sur Bornéo.	Pas de prophylaxie pour les zones urbaines ou côtières Ailleurs, MQ ou D ou AV/PG	Non
Malawi	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Non
Mali	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Maroc	Risque très limité dans les zones rurales de la province de Chefchaouen (zone 1). Aucun risque à Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech et Fès	Pas de prophylaxie	Non
Maurice (île)	Régions rurales seulement (zone 1), mais aucun risque à Rodrigues	Pas de prophylaxie	Non
Mauritanie	Toutes les régions, sauf au nord (Dakhlet-Nouadhibou et Tiris-Zemour)	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Mayotte	Toutes	MQ ou D ou AV/PG facultatif si <7j pour tt le pays	Non

**RISQUE DE PALUDISME SELON LES REGIONS
DANS LES PAYS OU LE PALUDISME EST ENDEMIQUE (novembre 2011)**

CQ : chloroquine – PG : proguanil – AV : atovaquone - MQ : méfloquine - D : doxycycline

NB : On considère qu'il n'y a pas de paludisme dans les pays qui n'apparaissent pas sur cette liste.

Pays	Régions présentant des risques pour le paludisme dans ce pays (d'après le CDC)	Recommandations françaises (selon le BEH)	Vaccination antiamarile
Mexique	Petits foyers à la frontière du Guatemala et de Belize dans les États de Chiapas, Quintana Roo et Tabasco ; Régions rurales des Etats de Nayarit, Oaxaca et Sinaloa ; Entre les 24° N et 28° N et le 106° O et 110° O (Chihuahua, Durango, Sonora). Aucun risque à la frontière des États-Unis, ni dans les zones touristiques côtières (Pacifique et Golfe). Pas de prophylaxie recommandée pour la plupart des séjours touristiques, sauf exceptionnels séjours frontaliers.	CQ (srtt <i>P. vivax</i>), facultatif si < 7j pour tt le pays	Non
Mozambique	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Non
Myanmar (anc. Birmanie)	Régions rurales < 1000m. Pas de risque à Yangon (Rangoon) et à Mandalay.	MQ ou D ou AV/PG (Doxycycline ou AV/PG le long de la frontière de la Thaïlande)	Non
Namibie	Nord du pays, Omaheke et Otjozondjupa, ainsi que le long des fleuves Kavango et Kunene	MQ ou D ou AV/PG	Demandé si escale dans une région endémique
Népal	Régions rurales à moins de 1200 m d'altitude du Terai, à la frontière indienne et dans les vallées de Chitwan, Dang, Makwanpur et Udaypur Sindhupalchowket. Aucun risque à Katmandou et dans les treks typiques de l'Himalaya	CQ/PG ou AV/PG pour Terai Ailleurs, pas de prophylaxie	Non
Nicaragua	Régions rurales et à la périphérie de Managua	CQ (srtt <i>P. vivax</i>), facultatif si < 7j pour tt le pays	Non
Niger	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Nigeria	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Nouvelles-Hébrides	(voir Vanuatu)		
Oman	Risque limité dans des régions isolées de la province de Musandam	Pas de prophylaxie	Non
Ouganda	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Ouzbékistan	Cas sporadiques à Uzunskiy, Sariassiskiy et Shurchinskiy (région de Surkhanda- Rinskaya).	Pas de prophylaxie	Non
Pakistan	Toutes les régions à moins de 2 000 m d'altitude, y compris les villes	MQ ou D ou AV/PG	Non
Panama	Régions rurales de provinces : Bocas del Toro, Darien et San Blas (et les îles). Aucun risque dans la région du Canal ni dans la ville de Panama	CQ (srtt <i>P. vivax</i>) pour l'O, facultatif si < 7j MQ ou D ou AV/PG pour l'E (Darien, San Blas et dans les îles San Blas)	Oui à l'est du canal (pas de risque dans la zone du Canal, Panama city et les Iles San Blas)
Papouasie-Nouvelle-Guinée	Toutes en dessous de 1800m	MQ ou D ou AV/PG	Non

**RISQUE DE PALUDISME SELON LES REGIONS
DANS LES PAYS OU LE PALUDISME EST ENDEMIQUE (novembre 2011)**

CQ : chloroquine – PG : proguanil – AV : atovaquone - MQ : méfloquine - D : doxycycline

NB : On considère qu'il n'y a pas de paludisme dans les pays qui n'apparaissent pas sur cette liste.

Pays	Régions présentant des risques pour le paludisme dans ce pays (d'après le CDC)	Recommandations françaises (selon le BEH)	Vaccination antiamarile
Paraguay	Dans trois départements : Alto Parana, Caaguazu et Canendiyu	CQ (srtt <i>P. vivax</i>) pour l'E, facultatif si <7j Ailleurs, pas de prophylaxie	Oui pour tout le pays (surtout zones forestières de l'E et l'O)
Pérou	Tous les départements en dessous de 2000m, y compris Puerto Maldonado sauf : Arequipa, Moquegua, Puno et Tacna (c'est-à-dire au sud du pays). Remarque : aucun risque pour les voyageurs qui se rendent seulement à Lima et dans les environs, ainsi que dans les régions côtières au sud de Lima et dans les centres touristiques des hauts plateaux (Cuzco, Machu Picchu, Lac Titicaca)	MQ ou D ou AV/PG pour l'Amazonie Ailleurs, CQ (srtt <i>P. vivax</i>), facultatif si <7j	Oui (région à l'est des Andes et Amazonie <2300m) Pas de risque dans les villes de Cuzco et Machu Picchu
Philippines	Régions rurales en dessous de 600m. Pas de risque à Manille (ni les autres villes), ni dans les provinces de Aklan, Albay, Benguet, Biliran, Bohol, Camiguin, Capiz, Catanduanes, Cavite, Cebu, Guimaras, Iloilo, Northern Leyte, Southern Leyte, Marinduque, Masbate, Eastern Samar, Northern Samar, Western Samar, Siquijor, Surigao Del Norte	MQ ou D ou AV/PG	Non
République centrafricaine	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
République démocratique du Congo	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
République dominicaine (Saint - Domingue)	Dans les régions rurales, <i>P. falciparum</i> avec un risque le plus élevé dans les régions limitrophes d'Haïti : Dajabón, Elias Pina and San Juan. Dans les autres régions, risque bas à négligeable.	CQ	Non
Rwanda	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Sahara occidental	Risque très limité	Pas de prophylaxie	Non
Salomon (îles)	Toutes, sauf au sud (Rennell et Bellona), à l'est (Temotu), et dans les îles de Tikopia, Anuta, Fatutaka	CQ/PG ou AV/PG	Non
Salvador	Voir El Salvador		
Sao Tomé et Príncipe	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Sénégal	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Sierra Leone	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Somalie	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Soudan	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui

**RISQUE DE PALUDISME SELON LES REGIONS
DANS LES PAYS OU LE PALUDISME EST ENDEMIQUE (novembre 2011)**

CQ : chloroquine – PG : proguanil – AV : atovaquone - MQ : méfloquine - D : doxycycline

NB : On considère qu'il n'y a pas de paludisme dans les pays qui n'apparaissent pas sur cette liste.

Pays	Régions présentant des risques pour le paludisme dans ce pays (d'après le CDC)	Recommandations françaises (selon le BEH)	Vaccination antiamarile
Sri Lanka	Toutes les régions rurales, sauf les districts de Colombo, Galle, Kalutara et Nuwara Eliya	CQ/PG ou AV/PG (srtt <i>P. vivax</i>) facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Surinam	Toutes sauf dans le district de Paramaribo et les régions côtières au Nord du 5° N (Nickerie, Coronie, Saramacca, Wanica, Commewijne et Marowijne)	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Swaziland	Toutes les basses terres au nord et à l'est (frontière du Mozambique, région de Libombo autour de Big Bend, Mhlume, Simunye et Tshaneni)	MQ ou D ou AV/PG	Non
Syrie	Province de El Hassaka (zones rurales de mai à octobre) le long de la frontière nord (zone 1). Aucun risque dans les districts de Damas, Deir-es-zor et Sweida	Pas de prophylaxie	Non
Tadjikistan	Toutes les régions en dessous de 2500m, surtout à la frontière sud (région de Khatlon Oblast); au centre (Dushanbe), à l'ouest (Gorno-Badakhshan) et au nord (Leninabad)	CQ/PG ou AV/PG (srtt <i>P. vivax</i>) facultatif si <7j pour tt le pays	non
Tanzanie	Toutes en dessous de 1800m	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Tchad	Toutes	CQ/PG ou AV/PG	Oui
Thaïlande	Régions rurales à la frontière du Cambodge, Laos et Myanmar. Aucun risque dans les villes et les principaux centres de villégiature (Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Pattaya, Ko Phangan et Ko Samui). Risque très limité à Phuket et Phang Nga. Cas de résistance à la méfloquine signalés dans les régions situées à la frontière du Myanmar et du Cambodge	MQ ou D ou AV/PG pour les frontières du Myanmar, Laos, ou Cambodge et la Malaisie (surtout si exposition nocturne dans des régions rurales) Ailleurs, pas de prophylaxie	Non
Timor-Oriental	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Non
Togo	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Trinidad et Tobago	aucune	Pas de prophylaxie	Oui POUR Trinidad (à évaluer pour les séjours exclusivement urbains à Port of Spain)
Turkménistan	Risque au sud-est (région de Mary) et dans les plaines entre les fleuves Murgab et Tedzhen (zone 1)	Pas de prophylaxie	Non
Turquie	Région de Cukurova/Amikova et sud-est de l'Anatolie (Adana, Adryaman, Batman, Bingol, Bitlis, Diyarbakar, Elazig, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Icel, Kahraman Maras, Kilis, Mardin, Mus, Osmaniye, Sanli Uurfa, Siirt, Sirnak et Van) de mai à octobre. Aucun risque dans les principales régions touristiques de l'ouest et du sud-ouest.	Pas de prophylaxie	Non

**RISQUE DE PALUDISME SELON LES REGIONS
DANS LES PAYS OU LE PALUDISME EST ENDEMIQUE (novembre 2011)**

CQ : chloroquine – PG : proguanil – AV : atovaquone - MQ : méfloquine - D : doxycycline

NB : On considère qu'il n'y a pas de paludisme dans les pays qui n'apparaissent pas sur cette liste.

Pays	Régions présentant des risques pour le paludisme dans ce pays (d'après le CDC)	Recommandations françaises (selon le BEH)	Vaccination antiamarile
Vanuatu (anc. Nouvelles-Hébrides)	Toutes Sauf l'île de Futuna, et Port Vila et Luganville sont pratiquement indemnes	CQ/PG ou AV/PG	Non
Venezuela	Régions rurales des États suivants : Apure, Amazonas, Barinas, Bolivar, Sucre, Tachira et Delta Amacuro. Région des Chutes de l'Ange	MQ ou D ou AV/PG pour l'Amazonie Ailleurs, CQ (surtout <i>P. vivax</i>)	Oui (pas de risque à Caracas, Valencia et sur la Côte N)
Viêt-Nam	Régions rurales seulement. Pas de risque dans le delta du Fleuve Rouge, le delta du Mekong et dans la plaine côtière au nord de Nha Trang, ni dans les villes de Hanoi, Ho Chi Minh City (Saigon), Can Tho, Da Nang, Hue, Nha Trang, Qui Nhon et Haiphong. Risque plus élevé dans la partie occidentale des provinces côtières de Khanh Hoa, Ninh Thuan, Quang Nam et Quang Tri, dans la province de Binh Phuoc, et sur les plateaux du SO à moins de 1500 m d'altitude au sud du 18°N des provinces de Dak Lak, Dak Nong, Gia Lai and Kon Tum,	Pas de prophylaxie pour bande côtière et deltas Ailleurs, MQ ou D ou AV/PG	Non
Yémen	Toutes, sauf à plus de 2000 m. Aucun risque à Sana'a (2230 m)	MQ ou D ou AV/PG	Non
Zaïre	voir République démocratique du Congo		
Zambie	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Non
Zimbabwe	Toutes (y compris les Chutes Victoria), sauf dans les villes de Harare et de Bulawayo	MQ ou D ou AV/PG	Non