

PRISE EN CHARGE D'UNE ANGINE À L'OFFICINE



SITUATION 1 LE PATIENT SE PRÉSENTE SPONTANÉMENT À L'OFFICINE

Étape 1 : Grille d'éligibilité : Vérification des critères

- Âgé > 10 ans
- Présentant des symptômes évocateurs d'angine (mal de gorge provoqué ou augmenté par la déglutition)
- Symptômes d'apparition récents (< 8 jours)
- Apte à communiquer des informations médicales suffisantes
- Absence de risque de grossesse
- Aucun voyage tropical réalisé dans les 2 à 5 derniers jours avec une vaccination antidiphthérique non à jour ou non renseignée
- Si âgé de 10 à 15 ans : absence d'éruption cutanée associée
- Si âgé de + de 15 ans : Score de Mac Isaac* ≥ 2
- Absence d'odynophagie à répétition : < 3 épisodes dans les 6 derniers mois sans consultation par le médecin
- Absence d'épisode d'angine dans les 15 derniers jours
- Absence d'immunodépression ou risque d'immunodépression dû à une pathologie (VIH) ou à un médicament (corticothérapie au long cours, chimiothérapie, immunosuppresseurs, carbimazole, méthimazole ou dérivé prescrit pour hyperthyroïdie)
- Absence de contre-indication à l'utilisation des spécialités à base des principes actifs suivants : amoxicilline, céfuroxime, céfpodoxime, aizthromycine, clarithromycine et josamycine conformément au RCP des AMM
- Absence d'insuffisance rénale sévère (DFG ≥ 30 mL/min/1,73 m² selon CKD-EPI ou ≥ 40 pour prescription céfpodoxime)
- Absence d'antibiothérapie en cours pour une autre pathologie
- Aucune intolérance médicamenteuse ou allergie signalée
- Absence de port de cathéter veineux implanté

Locaux adaptés :

- espace de confidentialité
- point d'eau / SHA



Formation

- agréée
- durée de 4h
- e-learning possible



Conseils patients



Traçabilité et partage des informations avec médecin

traitant :

incription dans le DMP ou envoi par messagerie sécurisée ou remise d'une attestation papier au patient

Facturation :

transmettre la facture et enregistrer dans le DMP le compte-rendu : "Prise en charge de l'angine à l'officine"

SI LE PATIENT EST ÉLIGIBLE →

Étape 2 :

Élimination des signes de gravité

- Température > 39.5°C
- Pression Artérielle Systolique > 90 mmHg
- Fréquence Cardiaque < 110/mn
- Fréquence Respiratoire < 20/mn
- Absence de difficultés respiratoires, trismus, hypersalivation, cervicalgie ou torticolis
- Troubles digestifs importants chez l'enfant (vomissements, diarrhée)

S'IL A 15 ANS OU + →

Étape 3 : Réalisation du score de Mac Isaac


- Absence de toux **+1** ;
- Adénopathie cervicale antérieure sensible **+1** ;
- Température > 38°C **+1** ;
- Augmentation de volume ou exsudat amygdalien **+1** ;
- Âge [15 ; 44 ans] **0** ;
- Âge ≥ 45 ans **-1**.

➔ Si Score de Mac est < 2, le TROD n'est pas réalisé

SI AUCUN SIGNE DE GRAVITÉ ↓


Étape 4 : Réalisation du TROD angine

Positif +




Invalide

Refaire un second test
Si invalide à nouveau :
orientation vers le médecin



Négatif -

Pas de délivrance d'antibiotique
Traitement symptomatique



SI TROD POSITIF ↓

Étape 5 : Délivrance de l'antibiotique adapté

Adulte

- **Amoxicilline** 1g x2/j pendant 6 j
- Si allergie aux pénicillines : **céfuroxime axétil** 250 mg x2/j pendant 4 j ou **céfpodoxime proxétile** : 100 mg x2/j pendant 5 j
- Si contre-indication aux bêta-lactamines : **clarithromycine** 250 mg x 2/j pendant 5 j

Enfant

- **Amoxicilline** 50 mg/kg/j en 2 prises/j pendant 6 j (max 2g/j)
- Si allergie aux pénicillines : **Céfpodoxime proxétile** : 8 mg/kg/j en 2 prises/j pendant 5 j (max 200 mg/j)
- Si contre-indication aux bêta-lactamines : **Clarithromycine** 15 mg/kg/j en 2 prises/j, pendant 5 j (max 1g/j)

SI AU MOINS UN SIGNE DE GRAVITÉ :

Orienter vers le médecin



SITUATION 2 LE PATIENT EST ORIENTÉ PAR UN MÉDECIN

Si âge ≥ 3 ans ET présence d'ordonnance conditionnelle, vérifier sa validité (< 7j)



Réalisation du TROD angine



Si TROD positif → Délivrance de l'antibiotique prescrit

